

## FICHE TECHNIQUE

### Mélange « accueil auxiliaires »

Composition\* : *Achillea millefolium, Campanula rapunculoides, Centaurea cyanus, Centaurea thuillieri, Cichorium intybus, Coriandrum sativum, Daucus carota, Echium vulgare, Foeniculum vulgare, Geranium pyrenaicum, Glebionis segetum, Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare, Lychnis flos-cuculi, Malva moschata, Malva sylvestris, Matricaria recutita, Origanum vulgare, Papaver rhoes, Reseda luteola, Silene latifolia alba, Silene Vulgaris, Tragopogon pratensis, Verbascum thapsus, Agrostemma githago*

Ce mélange a été spécialement conçu pour favoriser la lutte intégrée dans les vergers de production. Il a retenu toute l'attention de plusieurs centres de recherches qui ont étudié, en 1998 et 2000, l'intérêt de ces plantes pour les insectes auxiliaires (pas moins de 21 espèces de syrphes ont été relevées dans ces bandes fleuries d'essais).

Il est composé uniquement de fleurs sauvages annuelles, bisannuelles et vivaces. La pérennité est de 5 ans maximum.

Densité recommandée : 2,5 g/m<sup>2</sup>

Hauteur moyenne : 100 cm.

Période de floraison : de mi-mai à mi-septembre.

Intérêt du mélange : abeilles, papillons, insectes auxiliaires.

Les fleurs sauvages, présentes dans ce mélange, ont une origine régionale garantie jusqu'à épuisement des stocks. Les semences de base ont été récoltées dans la nature, en Belgique et dans le Nord de la France (notamment avec la collaboration du CBN de Bailleul) et produites dans des champs de cultures situés dans les mêmes régions.

*Tous nos mélanges sont favorables aux polliniseurs et contribuent au développement de la biodiversité.*

#### Technique de mise en œuvre recommandée :

Il est vivement recommandé d'effectuer un faux semis. Cette technique consiste à travailler une première fois le sol, finement, et d'enlever toutes les touffes d'herbes et rhizomes éventuels. Ce travail sera réalisé à l'aide d'une fraise ou, mieux encore, à l'aide d'une enfouisseuse de pierres. Un second travail du sol est effectué sur les premiers cm, deux ou trois semaines plus tard. Ainsi, les jeunes plantules d'adventices seront éliminées. Le semis sera réalisé en surface (ne pas enfouir les semences) juste après ce travail du sol et suivi d'un roulage.

Périodes de semis : avril à mi-mai, septembre (recommandé) à mi-octobre.

*\*Cette composition est susceptible d'être quelque peu modifiée en fonction de nos productions et de l'état de nos stocks, sans modification de nos prix.*