



## FICHE TECHNIQUE

### Mélange « fleurs mellifères »

Composition\* : *Lotus corniculatus, Onobrychis viciifolia, Centaurea thuillieri, Cichorium intybus, Clinopodium vulgare, Daucus carota, Dipsacus fullonum, Echinops sphaerocephalus, Echium vulgare, Foeniculum vulgare, Geranium pyrenaicum, Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare, Malva moschata, Origanum vulgare, Prunella vulgaris, Reseda luteola, Silene latifolia alba, Silene vulgaris, Silybum marianum, Verbascum nigrum, Agrostemma githago, Borago officinalis, Centaurea cyanus, Glebionis segetum, Papaver rhoeas*

Ce mélange a été spécialement conçu pour nourrir les pollinisateurs de nos régions (abeille domestique, abeilles sauvages, papillons, ...) Il est composé uniquement de fleurs sauvages annuelles, bisannuelles et vivaces.

La pérennité est de 5 ans maximum.

Densité recommandée : 2,5 g/m<sup>2</sup>

Hauteur moyenne : 100 cm.

Période de floraison : de mi-mai à mi-septembre.

Intérêt du mélange : abeilles, papillons, insectes auxiliaires.

Les fleurs sauvages, présentes dans ce mélange, ont une origine régionale garantie jusqu'à épuisement des stocks. Les semences de base ont été récoltées dans la nature, en Belgique et dans le Nord de la France (notamment avec la collaboration du CBN de Bailleul) et produites dans des champs de cultures situés dans les mêmes régions.

*Tous nos mélanges sont favorables aux polliniseurs et contribuent au développement de la biodiversité.*

#### Technique de mise en œuvre recommandée :

Il est vivement recommandé d'effectuer un faux semis. Cette technique consiste à travailler une première fois le sol, finement, et d'enlever toutes les touffes d'herbes et rhizomes éventuels. Ce travail sera réalisé à l'aide d'une fraise ou, mieux encore, à l'aide d'une enfouisseuse de pierres. Un second travail du sol est effectué sur les premiers cm, deux ou trois semaines plus tard. Ainsi, les jeunes plantules d'adventices seront éliminées. Le semis sera réalisé en surface (ne pas enfouir les semences) juste après ce travail du sol et suivi d'un roulage.

Périodes de semis : avril à mi-mai, septembre (recommandé) à mi-octobre.

\*Cette composition est susceptible d'être quelque peu modifiée en fonction de nos productions et de l'état de nos stocks, sans modification de nos prix.